

VEK har under 1996 haft tre ledamöter i Entomologisk Tidskrifts redaktionskommitté: Göran Andersson, Bengt Gunnarsson och Torkel Hagström. Till VEK:s revisorer omvaldes vid årsmötet Bertil Andrén och Hans Ryberg med Bengt Carlsson som suppleant. Chester Svensson och Torkel Hagström ombads att fungera som valberedning även under 1996. VEK representeras i SEF:s styrelse av Per Almkvist som innehar posten som kassör.

Årsavgiften 1996 var 50 kr, för familjemedlem 10 kr. Prenumerationsavgiften för Entomologisk Tidskrift var 160 kr. Distributionen av ET sköts fr.o.m. 1994 av SEF centralt.

VEK:s omsättning var under året 53.100 kr. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 63.500 kr, därav 26.600 kr i kassa. Försäljningen av entomologiskt material av egen import

till självkostnadspris svarar för en betydande del av omsättningen.

VEK har liksom tidigare år haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia osv. VEK ingår i stödorganisationen för Göteborgs Botaniska trädgård och är föreningsmedlem i Göteborgs biologiska förening.

Alltsedan starten 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Naturhistoriska museet. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i januari 1997

Ted von Proschwitz
sekreterare



INTRESSANTA FYND AV SKALBAGGAR 1996

av
JOHNNY LINDQUIST

Ytterligare ett år är till ända, ett år med glädjande tecken på ökad aktivitet. Bl a har jordlöparspecialisten Håkan Ljungberg flyttat till stan vilket medfört "nytt blod" och med det, nya intressanta fynd.

Det har med tiden utkristalliserats en "subgrupp" av skalbaggsintresserade i Göteborg/Kungälv, och du som är intresserad kan höra av dig till någon av nedanstående rapportörer, och kanske hänga med ut på någon exkursion i vår.

Bengt Carlsson har i en del av sina rapporter hämtat intressanta uppgifter ur ett manuskript om Göteborgstraktens skalbaggar författat av Emil Sandin (1852-1923). Sandins manuskript har aldrig publicerats, och det är som Bengt påpekar mycket intressant att jämföra de förändringar som har skett under de dryga 70 år som gått.

Under året blev jag upprindad av GöteborgsPosten, som undrade om jag hade något intressant i skalbaggsväg att rapportera till dem. Därför har

några av fynden nedan även gått att läsa om i GP:s ute-sida, och jag vill tacka Karl Johan Bondeson för detta bidrag till populariseringen av våra in-sekter.

Jag vill även tacka nedanstående rapportörer, samt Stig Lundberg för kontrollbestämningar och värdefull information om vissa arter.

Bertil Andrén	(BA)
Bengt Carlsson	(BC)
Håkan Ljungberg	(HL)
Johnny Lindquist	(JL)

Jag vill till sist göra eventuella kommande rapportörer uppmärksamma på att jag flyttat. Min nya adress är:

Johnny Lindquist
Vasagatan 2B
411 24 Göteborg
031-711 56 89

***Calosoma inquisitor* L.**

mindre larvmördare

HA Lindome, Sandsjöbacka 09.06.1996 (BC), i stor mängd på ett litet område där ekskogen var angripen av fjärils-larver. **Rödlistad, hotkategori 3, sällsynt.** Enligt Sandin "funnen i löfskogarna under de år då ekvecklarnas (*Tortrix viridana*) larver härja. Perioder då den uppträtt i stor mängd: Råda maj 1893, Slottsskogen maj 1899, Kullaviks ekskog i Släp juni 1911, 1912, 1913. Pixbo maj 1921 (Lindroth)."

***Bembidion fumigatum* Duft.**

marskstrandlöpare

I äldre litteratur räknas denna art som en raritet, endast känd från några få kustnära lokaler i SK och HA. Under de senare årtiondena har den dock blivit betydligt vanligare, och får nu betraktas som lokalt allmän i SK, även inne i landet (Ljungberg & Hägg 1989). I HA gjordes det första fyndet vid Harplinge 1948 (Carl H. Lindroth), där arten togs i 1 ex vid ett litet kärr nära havet. Dessutom har ett par nyare fynd gjorts i södra HA: Mellbystrand 07.06.1996 (JL), Gullbranna, Genevadsåns utlopp 02.07.1994, under driftmaterial på sandstrand (HL). Gemensamt för

alla dessa tre fynd är att de gjorts på eller nära sandiga havsstränder, under förhållanden som tyder på att det rör sig om vinddrivna exemplar. I år har dock flera fynd gjorts i norra HA och södra BO, i för arten helt naturliga biotoper. Dessa fynd är: HA Fjärås, Lygnern 12.5.1996 (BC), Särö, Brands-torpsviken 26.04.1996 2 ex bland vass och kaveldun i ett kärr alldeles innan-för havsstranden (HL), Särö, Skörvalla-viken 26.05.1996 talrik i vassvegetation vid havsstranden (HL), Onsala, Lunna, Kärremosse 26.05.1996 1 ex i vass-vegetation (HL), Släp, Hagryd Dala 07.09.1996, 1 ex på vegetationsrik strand vid damm (HL); BO Kungälv, Ragnhildsholmen 27.5.1995 2 ex i vassar vid Nordre älv (BC), Hönö 31.5.1996 1 ex i ett litet kärr (BC). Uppenbarligen är arten nu bofast i Göteborgstrakten.

***Bembidion varium* Oliv.**

gyttjestrandlöpare

VG Vänersborg, Hullsjön, vid fågel-tornet 09.07.1996 (HL), 1 ex på vegetationsfattig, lerig strand. Arten är vanlig på leriga havsstränder från BO till Stockholmstrakten, och förekommer i SK även på många lokaler inne i landet. Längre norrut är dock fynden vid insjöar få (exempel är Tåkern i ÖG samt Kvismaren i NÄ). I VG tidigare endast funnen i Göteborgstrakten.

***Pterostichus anthracinus* Ill.**

gyttjesvartlöpare


VG Göteborg, Rya skog 13.10.1996 (BA, BC, HL), flera ex i alkärriga partier av skogen. En sällsynt och framför allt lokal art, som kräver ett gyttigt/lerigt underlag och sparsam markvegetation. Förutom i alkärr lever den också på helt öppna, gärna betade strandängar (Ljungberg 1994, 1995). På Emil Sandins tid uppgavs arten från följande lokaler i Göteborgstrakten: Rya skog, Örgryte, Jonsered, Särö, Släp, Mölndal. Senare västsvenska fynd finns, förutom från Rya skog, från Fjärås (Borgudden 1974) och Vallda (Hamra alkärr, senast 1980).

Agonum marginatum* L.*gulkantad kärrlöpare**

HA Vallda, strax N om Sandön 26.05.1996 1 ex vid en grund vattensamling på kortvuxen gräsmark strax innanför havsstranden (HL). BO Rörö, västra stranden 08.09.1996 2 ex under sten på stenig havsstrand med lergrusigt underlag (HL). Emil Sandin betecknar arten som *ej sällsynt över hela Göteborgstrakten*, och uppgav den från Styrso, Brännö, Hönö, Öckerö, Grötö och Björkö. I Naturhistoriska museets samlingar finns följande fynd efter 1950: HA, Vallda Sandö 1959 och 1961 (Gösta Svensson), 1969 (Anders Törnvall); VG, Göteborg, Rya Skog 1965 (Jan Jonasson); Skarvik 1969 (Torkel Hagström), 1974 (Anders Törnvall). **Rödlistad, hotkategori 4, hänsynskrävande.**

Panagaeus cruxmajor* L.*större korslöpare**


BO Mo, Södra Bullaren, Smeviken 03.07.1996 (BA, exemplaret donerat till Naturhistoriska museet). Liksom följande art har den större korslöparen minskat starkt under efterkrigstiden - sannolikt av samma skäl (upphörande strandbete). Den påträffas nu regelbundet på mycket få lokaler utanför ÖL och GO. Det aktuella fyndet, som består av en bakkropp, gjordes vid håvning i strandvegetation. Förmodligen har det döda exemplaret suttit i ett spindelnät (båda våra *Panagaeus*-arter klättrar gärna upp i vegetationen). **Rödlistad, hotkategori 4.**

*Panagaeus cruxmajor****Chlaenius nigricornis* Fabr.****guldgrön sammetslöpare**

HA Onsala, kärr S om Lunnaberg, 26.05.1996 (HL), 2 ex under sten vid stengärdesgård nära stranden. Stranden av detta lilla kärr är sedan lång tid tillbaka betad, och har utvecklat den typiska "*Chlaenius*-karaktären" med kortsnaggad växtlighet och ett tätt mosstäck i markytan. Den intilliggande Kärremosse är betydligt mer igenvuxen, och har en annan jordlöparfauna (se nedan). Båda dessa kärr ligger i det område som av många lokala samlare benämnts "Bolgen". I Göteborgs Naturhistoriska Museum står 2 ex av *Chlaenius nigricornis* med denna lokaluppgift, från 1977 och 1979, respektive (det sistnämnda exemplaret insamlat av Anders Törnvall). Namnet "Bolgen" omfattar tyvärr ett rätt vidsträckt område med varierande naturtyper, och står dessutom ej på de vanligt förekommande kartbladen. Detta ledde till en viss frustration hos den samlare som - efter att ha cyklat i duggregn från Göteborg på en enväxlad Monark från *anno dazumal* - förgäves sökte återfinna lokalen (detta i april, i maj gick det som synes bättre). *Chlaenius nigricornis* är hos oss - om man undantar ÖL, GO och delar av SK - en mycket sällsynt och starkt minskande art. Gamla fynd från Göteborgstrakten finns från Styrso, Göteborg (Göta älv), Lerje, Källered och Öckerö, men efter 1950 är endast den ovannämnda förekomsten känd. **Rödlistad, hotkategori 4.**

Harpalus griseus* Panz.*sammetsfrölöpare**

HA Fjärås 31.08.1996 (HL) och 07.09.1996 (BA, BC, HL), talrikt förekommande i den övre delen av en mot söder sluttande rågåker (för några år sedan odlades här potatis). Marken kan närmast beskrivas som lersandig med grusinblandning. Upptäckten av denna förekomst gjordes redan 1987 av Bengt Ehnström, som sedan under flera års tid (åtminstone fram till 1993) återfunnit arten i stort antal (även andra



Odacantha melanura

samlare har besökt lokalen). Vid besöket den 31.08 påträffades *H. griseus* även i ett grustag några hundra meter från denna lokal, på mer ren sandmark (HL). Se även följande art. **Rödlistad, hotkategori 4.**

***Harpalus calceatus* Duft.**

trädeslöpare

HA Fjärås 07.09.1996, 3 ex i åkerkant tillsammans med föregående art (BA, BC, HL). Tidigare tagen på lokalen i endast 1 ex 1989 (av Gösta Gillerfors). Denna art är liksom den föregående arten i Sverige konstant endast i sydöstra SK. Längre norrut uppträder *H. griseus* och *H. calceatus* endast sporadiskt, och kan dyka upp i antal på en lokal några år för att sedan försvinna. De båda arterna påträffas mycket ofta tillsammans; även norr om Skåne vilket kan tyckas märkligt med tanke på deras spridda och oförutsägbara förekomst. **Rödlistad, hotkategori 4.**

***Acupalpus exiguus* Dej.**

svart dammlöpare

BO Säre, strandäng vid Lindesnäs 13.10.1996 2 ex, under sten invid en gårdesgård (BA, HL). **Ny för BO.** På strandäng som vid tillfället saknade öppet vatten, men som säkert översvämmas under våarna. Växtligheten består av kortsnaggat och tilltryckt gräs, starr och tåg, omväxlande med högre tuvor av bl. a. veketåg. *A. exiguus* är en rätt sällsynt art, som dock kan misstänkas vara något förbisedd på grund av sin ringa storlek.

***Odacantha melanura* L. vasslöpare**

BO Björlanda, Kippholmen, vid Nordre älv 13.10.1996, flera ex (BA, BC, HL). **Ny för BO.** Funnen dels vid sållning av vassrester ute i vattenkanten, dels under sten vid gårdesgård i strandängens kant. Strandängen är inåt rätt välbetad, utåt igenvuxen med vass. *Odacantha* hör tillsammans med följande art till de våtmarkslevande jordlöpare som ökat i antal och spritt sig under 1900-talet.

***Demetrias imperialis* Germ.**

korstecknad tasslöpare

HA Onsala, Lunna, Kärremosse 26.05.1996, flera ex i tät vassvegetation tillsammans med bl. a. *Bembidion fumigatum* och *Badister peltatus* (HL). BO Kungälv, Nordre älv vid Ragnhildsholmen 1995 (BA). **Ny för HA och BO.** Arten har ökat och spritt sig under senare år, förmodligen gynnad av den tilltagande igenväxning som förorsakats av övergödning och upphörd betesdrift.

***Gyrinus caspius* Ménétriés**

BO Morlanda 17.11.1996 (BA). **Ny för BO.** Förekommer talrikt i Rödsvatten på sydvästra Orust. Sjön är omgiven av en bård med vass, *Phragmites communis*, och havssäv, *Scirpus maritimus*, och ligger mycket havsnära. Vid extrema högvatten tränger havsvatten in i sjön, som har relativt höga värden på pH, alkalinitet och konduktivitet. Brackvattensarten borstnate, *Potamogeton pectinatus*, förekommer sparsamt. Tillsammans med *G. caspius* hävdades även enstaka ex av *G. marinus* Gyllenhaal och *G. suffriani* Scriba. I Sverige är *G. caspius* huvudsakligen kustbunden.

***Hydroporus elongatulus* Sturm**

HA Tölö 07.09.1996 (BA, BC och HL). **Ny för HA.** Arten fanns i några ex på kreaturstrampad mark med rikmossor i bottenskiktet vid Maderna i Sandsjöbackaområdet. Lokalen som ligger i anslutning till rinnande vatten påminner mycket om den som rapporterades för arten vid Nordre älv 1995. **Rödlistad, hotkategori 4.**

Stictotarsus duodecimpustulatus (Fabricius)

DS Valbo Ryr 25.08.1996 (BA)

Ny för DS. Håvades i antal i ån vid Torrud, Tången, nära Viksjön. I Sverige har arten en markant sydvästlig utbredning.

Agabus nebulosus (Forster)

BO Hjärtum 18.09.1996 (BA)

BO Tegneby 03.10.1996 (BA)

Arten, som upptäcktes som ny för BO 1995, har under året hittats på ytterligare två lokaler, en på Man-fältet, ett av Bohusläns stora grustäcksområden, där glädjande nog även *Neprioporus canaliculatus* (Lacordaire) återfanns samt en vid Skantorp på Orust. Vid Huveröd, där arten togs för första gången, observerades ett par ex under cm-tjock is i början av december. Dammen var sedan bottenfrusen fram till i början av april, då arten åter syn-tes till i det öppna vattnet vid strandkanten. Gölen torkade dock ut väldigt tidigt och förblev torr under sommaren och större delen av hösten.

Hydraena testacea Curtis

BO Spekeröd 28.01.1996 (BA)

DS Torp, Ellenösjön 15.09.1996 (BA)

Ny för BO och DS. Vid studium av övervintringsstrategier hos vattenlevande insekter högs i januari vakar i den ca 30 cm tjocka isen vid stranden av Ålevatten i Svartedalen. I växtmaterial, som togs med hem, fanns tre ex av denna väldigt karakteristiska skalbagge. Arten, som kräver rent vatten, har senare, under så gott som hela året, hittats på ett stort antal lokaler med både stillastående och sakta rinnande vatten. Baggarna lever i vattenbrynet bland växter och växtrester. **Rödlistad, hotkategori 2, sårbar.**

Hydraena pulchella Germar

BO Kville 24.07.1996 (BA)

Ny för BO. Arten hittades under sommaren i Joreälvens vattensystem, både i själva älven och i ett biflöde. På ett ställe med bergbotten och *Fontinalis* togs ett 10-tal ex. Arten kräver rent och

klart rinnande vatten och är i Sverige tagen på några få lokaler. Möjligen kan den vara något förbisedd på grund av sin ringa storlek och sin tröghet. I Danmark har den försvunnit från många lokaler under senare år. Tillsammans med *H. pulchella* togs även några ex av *H. riparia* Kugelann. **Rödlistad, hotkategori 3.**

Limnebius aluta Bedel

BO Hjärtum 03.09.1996 (BA)

Ny för BO. Ett antal ex av arten togs bland strandkantens mossor och andra växter i södra delen av Öresjön, Örstadbukten. Lokalen ligger alldeles intill en av Bohusläns mest intressanta moss- och örtrika ängsgranskogar.

Ochtebius bicolon Germar

BO Myckleby 11.05.1996 (BA)

Ny för BO. Flera ex i slam vid stranden av Henån vid utloppet från Ålekneken, i långsamt rinnande vatten.

Laccobius sinuatus Motschulsky

BO Ucklum 16.09.1995 (BA)

Ny för BO. Ett par ex av arten togs i en grusgropsdamm med lerslammig botten vid Huveröd.

Oulimnius tuberculatus (Müller)

BO Spekeröd 04.02.1996 (BA)

Arten togs i Ålevatten, vid sjöns utlopp, där vattnet i början av februari fortfarande var öppet, genom håvning bortunder iskanten vid stranden. Arten har senare under året tagits på flera lokaler runt om i BO, på ett par tillsammans med följande art.

Oulimnius troglodytes (Gyll.)

BO Spekeröd 28.01.1996 (BA)

Ny för BO. 1 ex av arten tog tillsammans med *Hydraena testacea* i växtmaterial från Ålevatten.

Xylodrepa quadrimaculata Scop.

HA Lindome, Sandsjöbacka 09.06.1996 (BC), två exemplar funna i larvangripen ekskog. E. Sandin: "Sällsynt. Jag har funnit den i löfskogar i Hagryd och Kullavik i Släp. Vistas uppe i trädstam-

marna, där den jagar larver."

Scaphisoma boreale Lundbl.

BO Kippholmen 07.08.1996 (JL)

Ny för BO. Vid undersökning av några trädsvampar på en kullfallen björk på jakt efter *Gyrophæna*-arter, fann jag även en *Scaphidiid* som tillvaratogs. Vid hemkomsten genitalpreparerades arten och det visade sig vara en *Scaphisoma boreale*. Arten är sällsynt och beskrevs första gången av Lundblad så sent som 1952, efter fynd i Sverige. Den är nu även anträffad i Norge, Finland och Österrike. *S. boreale* är inte funnen i VG vilket kan sporra intresserade att leta efter den på svamp. På svampen påträffades även *Gyrophæna affinis*.

Stenus calcaratus Scriba.

BO Björlanda, Kippholmen 13.10.1996 1 ex, i vassarna vid Nordre älv tillsammans med *Odacantha* (HL). BO Kungälv, Nordre älv vid Ragnhildsholmen 13.10.1996 (HL). Vid Kippholmen är arten tidigare tagen 1969 och 1971 av Anders Törnqvist (enligt exemplar på Naturhistoriska museet). **Rödlistad, hotkategori 3.**


Gyrophæna poweri Crotch.

DS Kroppefjäll 22.09.1996 (JL)

Ny för DS. Under en svamptur till Kroppefjäll tillsammans med Merete Haug, passade vi även på att samla in lite kortvingar. En av dessa visade sig vara *G. poweri*. Arten är ej allmän i övriga landet, och anträffas i olika svampar. I detta fallet ruttnande marksvamp. Vi fann även *G. congrua* Er. som enligt T. Palm skall vara sällsynt, men som jag stött på vid flera tillfällen här på västkusten, bl a i flera exemplar på Kippholmen 08.09.1996.

Anthocomus rufus Herbst.

BO Säve, Skattegården 13.10.1996 (BA, BC, HL). **Ny för BO.** Denna vackert röda art uppträder till skillnad från våra övriga malachiider på hösten. Larverna är rovdjur som lever på trägnagande insekter. I vassen vid Nordre älv.



Scaphisoma boreale



Xylodrepa quadrimaculata

Necrobia ruficollis Fabr.

HA Mellbystrand 07.06.1996 (JL)

Ny för HA. På grund av ökad hygien på slakterier, garverier och liknande platser, har denna synantropa art blivit mycket sällsynt. Den är tidigare endast funnen i SK, BL, ÖL, VG, UP och VS. Larverna är rovdjur som livnär sig på andra avfallsätande insekter. Ett ex påträffades, troligen vinddrivet, på sandig havsstrand. **Rödlistad, hotkategori 2.**

Cryptolestes corticinus Erich.

HA Mellbystrand 07.06.1996 (JL)

Denna lilla cucujid är betecknad med "i" (införd) för HA i senaste skalbaggs-katalogen, efter fynd av Gösta Gillerfors på fransk importerad massaved 1988. Detta exemplar kom flygande helt fritt på en campingplats, vilket kanske visar att arten finns, eller har etablerat sig i HA. Den är allmän i mellersta Sverige under barken på fristående tallar.

Tetropium fuscum Fabr.

BO Svartedalen, Äggdalen 20.10.1996 (JL)

Betydligt sällsyntare än sin släkting *T. castaneum*. Funnen under barken på stående, död, starkt insektsangripen gran. I området strax utanför Svartedalens naturreservat, där jag för närvarande undersöker skalbaggsfaunan, har jag även stött på de i dessa trakter

mindre vanliga skogsarterna, *Pytho depressus* och *Phloeonomus monilicornis*. Jag (JL) tar tacksamt emot alla fynduppgifter kring skalbaggar funna i detta område.

***Lilioceris merdigera* L.**

HA Lindome, Sandsjöbacka 09.06.1996 (BC)

Ett exemplar på liljekonvalj. E. Sandin: "Temligen sällsynt på Convallaria. Utbredd över hela området (Göteborgs-), men ej anträffad på öarna i skärgården."

***Cryptocephalus bilineatus* L.**

BO Uddevalla, Samneröd 17.07.1996 (BC) slaghåvad på gräsmark.

En liten, svart och gul, i färgteckningen starkt varierande art. Lever på prästkrage, *Chrysanthemum leucanthemum*.

Rödlistad, hotkategori 2.

***Longitarsus exoletus* L.**

BO Kungälv, Bohus Fästning 16.08.1996, på blåeld (BC). BO Tossene, Varpet 25.07. och 06.08. 1996, tillsammans med *L. nasturi* på blåeld. (BC)

Ny för BO.

***Altica longicollis* All.**

VG St. Amundön 26.08.1996 (BC)

Ett exemplar på ljung. E. Sandin: "Sällsynt. Upptäckt av Ågren på Brännö i skärgården juni 1907. Jag har funnit den temligen talrikt på ljung vid Bukärr i Släp juni 1921."

***Apion radiolus* Marsh.**

BO Öckerö 20.07.1996. På malva vid vägrenen till Burö (BC)

BO Kungälv, Bohus Fästning, 22.07.1996, på malva (BC)

BO Gullholmen, Kronoholmen 30.08.1974 (U. Holmer)

BO Solberga, Brattön 23.05.1954 (H. I. Andersson)

***Apion pallipes* Kirby.**

BO Säve, Trollered, 26.09.1996, slaghåvad på skogsbingel (BC)

BO Kungälv, Marieberg, 11.10.1994, på skogsbingel (BC)

VG Göteborg, Botaniska trädgården 01.06.1976 (H. W. Waldén)

E. Sandin: "Sällsynt. Göteborg, Ekeberg. Jag har funnit den i antal juni 1903 på *Mercurialis perennis* i Slottsskogen och vid Kullavik i Släp juni 1908. I siktgods från Slottsskogen anträffad av Lindroth vintern 1920 och 1921." Sällsynt är nog inte alldeles riktigt idag. I rätt biotop, äldre lövskog med skogsbingel, så hittar man i allmänhet *A. pallipes*. Ofta tillsammans med *A. flavipes*.

***Apion ononides* Gyll.**

BO Solberga, Ödsmåls kile 22.06.1996

(BC), BO Torsby, Höga 01.07.1996 (BC)

BO St. Hermanö 12.08.1967 (U. Holmer), BO Gullholmen 12.08.1967 (U. Holmer), BO Skaftö 16.07.1960 (U. Holmer), HA Släp, Bukärr 24.05.1920 (E. Sandin)

Detta är en *Apion*-art som Sandin inte hade med i sitt manuskript, *Göteborgstraktens skalbaggsfauna*. Lite förvånande då Gyllenhaal fann den i Uddevallatrakten. Numera är den inte någon sällsynthet utmed kusten på stallört, *Ononis hircina*. Ett ex fanns i museets obestämda *Apion*-material. Huruvida det finns fler *A. ononides* tagna i Göteborgstrakten under tiden 1820-1920, har jag (BC) inte kunnat kontrollera ännu.

***Apion hydrolapathi* Marsh.**

HA Vallda Sandö 09.06.1996 och 08.08.1996 (BC)

Ny för HA. Tord Nyholm anmälde denna art som ny för Sverige i slutet av 1930-talet. Han förmodade att den skulle sprida sig längs Västkusten, vilket verkar vara ett riktigt antagande. På *Rumex*. **Rödlistad, hotkategori 2.**