

INTRESSANTA FYND AV SKALBAGGAR 1998

av
JOHNNY LINDQUIST

Under det regniga året 98, har jag varit involverad i två större projekt. Dels inventering av skalbaggsfaunan i Bolgenområdet på Onsala, dels inventering av läderbagge i Västsverige tillsammans med Torulf Greek. Resultatet av läderbaggeinventeringen gick att läsa om i Torulfs utförliga artikel, AROMIA 3/98. Förutom övriga fynd ges nedan en lite utförligare presentation av de intressantaste arterna som påträffades under denna inventering.

Fynden från Onsala tas inte med i nedanstående rapporter utan kommer istället att tas upp i en separat, större artikel i kommande AROMIA.

Som vanligt, tack till nedanstående rapportörer. Jag vill också tacka GP:s UTE-redaktion, som upprepade gånger tagit upp artiklar från AROMIA på sin sida och på det sättet gett oss PR.

Det går även utmärkt att e-maila fyndrapporter till:
johnny.lindqvist@hassle.se.astra.com

Namnförkortningar

| | |
|------------------|------|
| Bertil Andrén | (BA) |
| Bengt Carlsson | (BC) |
| Torulf Greek | (TG) |
| Johnny Lindquist | (JL) |
| Håkan Ljungberg | (HL) |

Calosoma inquisitor (L.)

larvmördare

VG. Mölndal. Eklanda. 29.05.1998 (TG).

Ett dött ex på stig. Flera ex observerade i Göteborg, Änggårdsbergen under sommaren.

Rödlistad hotkategori 3.

Carabus clathratus L.

VG. Lerum kn. St-Lundby sn. Hunse red. 24.08.1998 (TG).

Vid vik av Mjörn. I murken stubbe, betad mark med kärr och strandäng. Denna på västkusten mycket sällsynta art har mig (JL) veterligen de senaste åren endast påträffats i Bolgenområdet på Onsala, (AROMIA 1/97) varför det är särskilt intressant när den påträffas på nya lokaler. Med tanke på artens dåliga spridningsförmåga indikerar den lång hävdkontinuitet och flera trevliga följearter borde kunna anträffas på lokalen.

Bembidion stephensi Crot.

BO. Västerlanda. 19.04.1998 (BA, BC).

Ny för BO. Tre ex på en fuktig lerslänt tillsammans med *Bembidion deletum*.

Rödlistad hotkategori 4.

Bembidion gilvipes Sturm.

BO. Rödbo. Ragnhildsholmen 09.05.1998 (BC).

Ett ex i växtrester nära strandkanten av Nordre älvs.

Dromius melanocephalus Dej.

HA. Onsala. Fjäreholms. 27.04.1998 (HL). På öppen, fårbetad sandmark nära havet, med kort gräsvegetation. Fyndet är det hittills nordligaste av *D. melanocephalus* i landet, och det andra från Halland (tidigare rapporterad från Hunnestad av Gösta Gillerfors, i Ent. Tidskr. 1982, s. 73). Möjligen är arten stadd i spridning. Lokalen är densamma som omnämndes under *Amara spreta* i förra årets skalbaggsrapport (AROMIA 1/98).

Trox scaber (L.)

VG. Nääs. Björkenäs. 25.07.1998 (TG).

I halek.

VG. Nääs slott, Slottsparken. 09.08.1998 (JL, TG).

Ett ex i fallfälta i ihålig jätteek med rester av fågelbo, vilket är ett typiskt

***Grynocharis oblonga* (L.)**

VG. Nääs. Slottsparken 04.08.1998 (TG).

I mulm i hålek. Mycket sällsynt i solex-ponerade, murkna högstubbar eller stammar av olika lövträd, främst asp.

Rödlistad hotkategori 2.

***Psammoecus bipunctatus* Fabr.**

BO. Kungälv. Röda grinden. 17.04.1998 (BC)

Ny för BO. Ett ex i växtrester på en bank ut mot Göta älv.



Psammoecus bipunctatus Fabr.

***Coccinella magnifica* Redf.**

HA. Fjärås bräcka. 02.08.1998 (BC).

Ett ex slaghåvad. *C. magnifica* är lik vår vanliga "Jungfru Maria nyckelpiga", men har i allmänhet större fläckar, samt en täckvingespets som sluttar brantare. Detta ses bäst i profil.

Tenebrio molitor* (L.)*stor mjölbagge**

VG. Nääs. Kullahagen 07.1998 (TG). På ekstubbe.

Den inomhus vanliga mjölbaggen kan som i detta fall sällsynt påträffas i sin ursprungsmiljö, utomhus i ihåliga murkna träd.

***Allecula morio* (Fabr.)**

VG. Nääs. Björkenääs. 06.08, 10.08. 1998 (TG).

Ett ex död i hålek, ett ex på ek. Liksom nästkommande art en nattaktiv sådan och med likartat levnadssätt.

Rödlistad hotkategori 4.

***Prionychus ater* (Fabr.)**

VG. Nääs. Slottsparken. 09.08. (TG, JL).

VG. Kärrbogärde. Hemsjö (TG).

VG. Hjälmsäter. Kinnekulle. 16.07. (TG, JL).

VG. Brunsbo storäng. Skara 23.07. (TG).

BO. Gullmarsberg, Uddevalla 19.08. (TG, JL).

HA. Särö Västerskog. 23.08. (TG).

VG. Floda säteriets allé 24.08.1998 på lind (TG).

Arten som påträffades under läderbaggeinventeringen både krypande på ek-stammar och i fallfällor verkar vara ganska vanlig på västkusten och finns snart sagt överallt där det finns någorlunda tillgång på hålträd.

Rödlistad hotkategori 4.



Prionychus ater (Fabr.)

***Pseudocistela ceramboides* (L.)**

VG. Nääs. Slottsparken. 25.07.1998 (TG).

VG. Öjared. Lerum 28.07.1998 (TG).

BO. Gullmarsberg, Uddevalla (TG, JL).

Arten förekommer på liknande lokaler, och med ett liknande levnadssätt som *Prionychus ater*, men förefaller vara något sällsyntare. Under läderbaggeinventeringen påträffades arten enstaka, medan *P. ater* kunde förekomma tämligen rikligt.

Rödlistad hotkategori 4.

***Mycetochara axillaris* (Payk.)**

VG. Kinnekulle, Hjälmsäter 16.07.1998 (JL).

Den största av våra *Mycetochara*-arter. Funnen krypande på murken men ännu levande lönnstubbe i skymningen. Arten utvecklas i olika lövträd som ek, ask, men främst bok där larven lever i fuktig rödmurken ved.

Rödlistad hotkategori 4.

Utvecklar sig i kärnorna hos olika körsbärsarter.

***Curculio crux* Fabr.**

BO. Rödbo. 01.06.1998 (BC).

Ny för BO. Ett ex på pil. A Törnvall tog denna art för ca 20 år sedan på västgötasidan där den verkar vara relativt vanlig, åtminstone detta år.

Rödlistad hotkategori 2.



Curculio crux Fabr.

***Phloeophagus thomsoni* (Grill.)**

VG. Kinnekulle. Hjälmsäter. 16.07.
1998 (JL).

Ny för VG. Samtliga våra tre arter av släktet *Phloeophagus* är sällsynta och rödlistade.

Både de vuxna djuren och larverna gnager gångar i veden på halvdöda stammar och stubbar av olika lövträd som bok, avenbok, hassel, alm m fl. De kan leva länge, generation efter generation i samma stubbe. Vid detta fynd tillfälle togs arten på samma murkna lönnstubbe där *Mycetochara axillaris* påträffades (se ovan). Tack till S. Lundberg för kontroll.

Rödlistad hotkategori 4.



Phloeophagus thomsoni (Grill.)

FÄLTKURS MED NATURVÅRDSINRIKTNING INSEKTER PÅ GOTLAND

19 - 25 JULI 1999

Hur kan insekterna utnyttjas i naturvården?

Det finns närmare 30 gånger så många ryggradslösa djur som ryggradsdjur i vårt land. Av dem är en överväldigande majoritet insekter. Insekterna har fått en allt större betydelse inom naturvårdsarbetet särskilt när man tänker på 'biologisk mångfald', men även som signalarter och indikatorarter.

KURSINNEHÅLL: Kursen är tänkt att ge en allmän orientering om insekterna utifrån deras levnadssätt och betydelse för naturvården. I mån av tid kan vi också ta upp insekternas systematik och morfologi samt hur man fanger, examinerar och preparerar dem. Gotlands särart i fråga om insekter kommer naturligtvis att betonas under kursen. Tiden ägnas främst åt dagexkursioner till olika intressanta platser på Gotland samt föreläsningar, nattfängst och ev. preparationsarbete.

Kursen avslutas med en tvådagarsexkursion till Stora Karlsö.



KURSLEDNING: Håkan Elmquist och Lars Imby
FÖRFRÅGAN: Tel. 0159-125 95 08-38 57 76



GOTLANDS LÄNS FOLKHÖGSKOLA, 620 12 HEMSE. TEL. 0498 - 20 36 50